



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Análisis Garantizado

Complejo Nutricional

Ácido Giberélico (GA3, GA4, GA7).	
No menos de	01.12%
Citocininas.	
No menos de	00.82%
Auxina (ANA).	
No menos de	24.34%
Ácido Glutámico.	
No menos de	05.57%

Complejo Vitaminico

B2, B6, y B4 como Fitosuplementos.	
No menos de	04.19%
Aminoácidos Libres.	
No menos de	02.75%
Acondicionadores como FPJ.	
No menos de	61.21%
TOTAL	100.00

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

VitalFrut® Es un complejo vitamínico de regulador nutricional, con una alta proporción de Vitaminas B1, B2, B6, Ácido Glutámico y Giberelinas, necesarios para el desarrollo y crecimiento de frutos, tubérculos y bulbos así mismo estimula el metabolismo de la planta en etapas de floración y amarre de frutos. **VitalFrut®** Aumenta la cantidad y calidad de producción ya que al ser aplicado durante la formación y desarrollo de frutos, tubérculos y bulbos incrementa su tasa de acumulación de fotosintatos en los tejidos de reserva.

RECOMENDACIONES DE USO . DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN.

MELON, SANDÍA, CALABAZA Y PEPINO. 150g. En 200L. De agua al inicio de la flor femenina. Repetir cada 10 días a partir del primer corte con 150g. En 400L. De agua.

PAPA, CEBOLLA Y AJO. 200g. En 200L. De agua al inicio de la formación del tubérculo o bulbos. Repetir a los 15 días.

BROCOLI Y COLIFLOR. 150g. En 200L. De agua al inicio de la formación del meristemo floral. Repetir a los 20 días.

TOMATE, CHILE, BERENJENA Y FRESA. 150g. En 200L. De agua al inicio de la formación del fruto. Repetir cada 15 a 20 días hasta finalizar los cortes.

MANZANO, DURAZNO Y CIRUELO. 200g. En 300L. De agua durante el inicio de la formación de los frutos del primer tercio. Repetir una vez cada 30 días con 250g. En 300L. De agua.

PAPAYA. 150g. En 300L. De agua al inicio de la formación de frutos del primer tercio. Repetir una vez cada 30 días con 250g. En 300L. De agua.

MANGO. 150g. En 300L. De agua durante el inicio de la formación de frutos. Repetir con 200g. En 300L. De agua al inicio del desarrollo de la fruta.

BANANO. 200g. En 300L. De agua durante el inicio de la formación del racimo. Repetir una vez cada 15 días con 250g. En 300L. De agua.

CITRICOS. 250g. En 300L. De agua al inicio de la floración. Repetir al inicio del crecimiento del fruto con 250g. En 200L. De agua.

PIÑA Y AGAVE. 150g. En 300L. De agua durante el inicio de la formación de la piña. Repetir una vez cada 15 días con 250g. En 300L. De agua.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. El equipo que utilice para las aplicaciones de uso agrícola debe reservarlo exclusivamente para este propósito.

Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. No se aplique este producto en los cultivos no recomendados, cuando estén asociados otros cultivos susceptibles. No permita que el viento lleve aspersión hacia otros cultivos. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vacío el envase, no vuelva a utilizarlo; destrúyalo.

USARSE.
Siempre Calibre su Equipo de Fumigación.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.
(SL) Intervalo de seguridad Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS. Se puede reingresar a las áreas tratadas 0 horas después de la aplicación del producto. No existe necesidad de retirar al ganado de pastos tratados.

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO. Abra con cuidado el envase girando la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse y en sentido contrario al viento para evitar inhalar el producto.

Verifique que el sello de seguridad mecánico o de aluminio no esté alterado. Llene el tanque de la aspersora con agua limpia a la mitad de su capacidad, agregue la cantidad previamente determinada, ponga el sistema de agitación a trabajar, acabe de llenar el tanque con agua y aplique.



VitalGreen®

