



Green-K® Bioestimulante complejo a base de Potasio, L-aminoácidos y vitaminas quelatadas. Los componentes de su formulación interactúan sobre los procesos metabólicos de los frutos, bulbos, tubérculos, flores, granos o semillas, favoreciendo la acumulación de fotosintatos en estos tejidos de reserva, recuperando el cultivo ante el posible atraso de crecimiento causado por condiciones adversas.

Todos los componentes de **Green-K®** se encuentran en forma libre, por lo tanto se asimila muy rápido sin ocasionar efectos en el proceso metabólico de la planta.

Esta composición hace que **Green-K®** pueda ser usado en la situación que se requiera o necesite, sugiriendo realizar aplicaciones desde la fase inicial de producción para prevenir retardos de crecimiento en los órganos de reserva y así obtener un óptimo crecimiento y asegurar el máximo desarrollo de producción.

Green-K® Ayuda al crecimiento de frutos y mejora la etapa de fructificación, incrementando las cosechas, ya que la aplicación de este producto permite ahorrar energía y mejorar el desarrollo de la planta durante las etapas críticas del ciclo reproductivo cuando requieren cantidades abundantes de estas estructuras proteicas.

Green-K® Puede ser aplicado con equipos mecánicos, analíticos o automáticos de aspersiones terrestres o aéreos como drones, inyección, fumigación mecatrónica, micronizada, entre otros; por su alta compatibilidad y su gran eficiencia molecular que evita daños a dosis altas y optimiza la cohesión molecular de mezclas.

RECOMENDACIONES DE USO .

Cultivo	Objetivo Nutricional	Recomendaciones	Dosis Kg/ha.
Aguacate, Cítricos, Mango, Guayabo y Papaya	Inducción, Desarrollo y Uniformización de Frutos	De 15 a 20 días antes del inicio de floración, inicio de formación de frutos y desarrollo de frutos.	2 a 4
Tomate, Fresa, Chile, Sandía, Melón, Pepino y Sandía.	Desarrollo y Uniformización de Frutos.	Inicio de formación de frutos y Desarrollo de frutos.	2 a 3
Manzano, Ciruelo, Vid, Peral, Nogal y Durazno.	Desarrollo y Uniformización de Frutos.	Inicio de formación de frutos y Desarrollo de frutos.	2 a 3
Papa y Espárrago	Desarrollo y Uniformización.	Inicio de formación y Desarrollo de tubérculos.	2 a 3
Brócoli, Coliflor y Col	Desarrollo y Uniformización.	Inicio de formación y Desarrollo de meristemas.	2 a 3
Tabaco y Hortalizas de Hoja	Desarrollo y Uniformización.	A las primeras 6 o 10 hojas verdaderas.	1 a 2
Maíz, Sorgo, Trigo, Arroz y Cebada	Desarrollo y Uniformización.	Floración y/o grano lechoso.	2 a 3
Cebolla y Ajo	Desarrollo y Uniformización.	Formación de bulbo con un aproximado de 7 hojas verdaderas y repetir a los dos semanas	2 a 4
Banano, Piña y Agave	Desarrollo y Uniformización.	Formación del fruto, meristemo floral y desarrollo del fruto.	3 a 4
Soya, Frijol y Cacahuate	Desarrollo y Uniformización.	Formación y desarrollo de vainas, cuadros y/o bellotas	2 a 3

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Análisis Garantizado

Complejo Nutricional

Potasio (K) como fuente dinámica.
No menos de 64.27%

Arginina y Triptófano como activadores.
No menos de 12.06%

Ácido Glutámico como potenciador de absorción.
No menos de 09.03%

Complejo Vitamínico

B2, B6, y B4 como Fitosuplementos.
No menos de 01.49%

Fulvatos y Humatos como Ac. Orgánicos disponibles.
No menos de 01.34%

Acondicionadores como FPJ.
No menos de 11.81%

TOTAL 100.00

